


# ALGORITMOS DIAGNÓSTICOS Y/O TERAPÉUTICOS

FICHA Nº 1

Dra. Silvia I. Falasco

## ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO DE LA HIPOGLUCEMIA



Su diagnóstico se basa en general sobre la “tríada de Whipple”: glucemia baja, sintomatología, desaparición de ésta tras la normalización de la glucemia.

Entre la signo sintomatología adrenocolinérgica los pacientes pueden presentar: taquicardia, palpitaciones, temblores, palidez, ansiedad, sudoración fría y náuseas.

Entre los síntomas neuroglucopénicos: hambre, vértigo, cefalea, debilidad, visión borrosa- diplopía, disminución de la capacidad de concentración, confusión, deterioro del sensorio, convulsiones, agresividad, delirio, etc.

#### BIBLIOGRAFÍA

1. Domínguez Escribano JR. Algoritmo diagnóstico y terapéutico de la hipoglucemia. *Endocrinol Nutr.* 2006;53(Supl 2):17-8
2. Puchulu Félix. El paciente con Hipoglucemia. En Argente-Alvarez. *Semiología Médica. Fisiopatología, Semiotecnia y Propedéutica.* 1ª edición. Buenos Aires, Argentina; Editorial Médica Panamericana; 2008: 1083-1089
3. Rojas Luis, Achurra Pablo, Pino Felipe, Ramírez Pedro, Lopetegui Marcelo, Sanhueza A Luis Manuel et al . Diagnóstico y manejo de la hipoglicemia en adultos diabéticos hospitalizados: evaluación de competencias en un equipo profesional multidisciplinario de salud. *Rev. méd. Chile* 2011 Jul; 139(7): 848-855