Curso Medicina Interna

SMIBA

Enfermedades neuromusculares.

Martín Nogués,
FLENI, Buenos Aires

10 de mayo del 2022

Como clínico, frente a un paciente con debilidad muscular o trastornos sensitivos que sugieren una patología periférica mi actitud preferencial es:

- A. No gastar tiempo innecesario. Redirigirlo al especialista.
- B. Tratar de hacer un diagnóstico clínico básico orientador para darle una respuesta al paciente.
- C. Dejar al especialista que ordene los estudios específicos (EMG, biopsia, etc).
- D. a y c son mi elección como clínico.

0% 0% 0% 0%

No gastar tiempo innecesario...

Tratar de hacer un diagnóstico...

Dejar al especialista que ord...

a y c son mi elección como clí...

Contador de contestaciones

30

Pregunta

De este curso quisiera salir sabiendo:

a) En base al interrogatorio y examen darle una aproximación diagnóstica y eventualmente terapéutica al paciente.

b) Saber cuándo y a quien derivar para consulta especializada.

Frente a un paciente con una enfermedad neuromuscular crónica (distrofia muscular, ELA, polineuropatía) mi preferencia es:

- A. Que los maneje por completo el especialista en enfermedades neuromusculares.
- B. Acompañar al paciente y al especialista como médico de cabecera.
- C. La rareza de estas enfermedades hace que para un clínico sea imposible intentar manejar estos pacientes.
- D. b y c son mi elección.

0% 0% 0% 0%

Que los maneje por completo ..
Acompañar al paciente y al e...
La rareza de estas enfermed...
b y c son mi elección.

Contador
de
contestaci
ones

30

Respecto de la interpretación del informe de un electromiograma

- A. Me alcanza con la lectura de la conclusión.
- B. Me gustaría poder interpretar los valores y los gráficos.
- C. Demasiado complejo.
- D. a) y c) son mi elección.

Me alcanza con la lectura de ...

Me gustaría poder interpretar ...

Demasiado complejo.

a) y c) son mi elección.

Contador
de
contestaci
ones

30

EMG y Velocidades de Conducción

- A- Evaluación muscular :EMG
- B- Evaluación de los nervios : Velocidades de conducción motoras y sensitivas.
- C- Técnicas especiales:
 - Búsqueda de Bloqueo
 - Onda F
 - Reflejo H
 - Estimulación repetitiva etc

1. Electromiograma propiamente dicho.

UNIDAD MOTORA

- Cuando cada fibra se contrae genera un pequeño potencial de acción “Potenciales miniaturas”
- La suma de los potenciales miniaturas forman el PUM

PATRONES ELECTROMIOGRÁFICOS

Normal

Miopático

Neurogénico

Duración y Amplitud normal

Duración y Amplitud disminuídas

Duración y Amplitud aumentadas

EMG: Trazado normal

- ✓ Reposo: Silencio eléctrico
- ✓ Actividad: PUMS normales en duración, amplitud y fases.

NORMAL

EMG: Trazado miopático

- ✓ Por reducción del número de fibras musculares por unidad motora (UM) los PUMs son de menor duración y amplitud
- ✓ Reclutamiento normal (número UM conservados)
- ✓ Potenciales breves, de baja amplitud y polifasia

Miopático

EMG: Trazado neurogénico

Etapas iniciales :

- ✓ Denervación de las fibras musculares: EMG Actividad espontánea presente.
- ✓ Se pueden ver potenciales pequeños (no confundir con miopatías)

Etapas más tardías:

- ✓ Reinervación
- ✓ Potenciales de mayor amplitud y duración
- ✓ Potenciales polifásicos

Neurogénico

ELECTROMIOGRAFÍA

El EMG estudia con electrodos de aguja los distintos grupos musculares en reposo y en actividad.

EN REPOSO

Silencio eléctrico

Actividad de placa

Potencial de inserción

Ondas agudas

Fibrilaciones

Fasciculaciones

Calambres

Mioquimias

Descargas repetitivas

Miotonía

EN ACTIVIDAD

Potencial de unidad motora (PUM).

ELECTROMIOGRAMA NEUROGÉNICO

- ELA
- Atrofia Espinal
- Síndrome post Poliomielitis
- HTLV I, II, HIV
- Enf de Kennedy etc

✓ Radiculopatía

✓ Lesiones de Plexos

- Mononeuropatía: STC, Lesión Cubital, Túnel Tarsiano.
- Polineuropatías: en general en las axonales
- Mononeuritis múltiples

En un informe de EMG en un paciente con parálisis facial, cual de los siguientes es un signo de mal pronóstico:

- A. Signos reinervatorios.
- B. Potenciales neurogénicos.
- C. Fibrilaciones.
- D. Ondas agudas positivas.
- E. c y d son correctas.

Signos reinervatorios.

Potenciales neurogénicos.

Fibrilaciones.

Ondas agudas positivas.

c y d son correctas.

Contador de contestaciones

30

2. ESTUDIO DE CONDUCCIÓN NERVIOSA.

NCS: Examples

Median motor study

Stimulate nerve and recording over muscle (APB)

Median sensory study

Stimulate nerve proximally and recording over nerve distally (antidromic)

Fuente: Dennis L. Kasper, Anthony S. Fauci, Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, J. Larry Jameson, Joseph Loscalzo: *Harrison. Principios de Medicina Interna*, 19e: www.accessmedicina.com
 Derechos © McGraw-Hill Education. Derechos Reservados.

Nervio Normal

Dispersión 4,0 ms

Latencia 1,8 ms

Nervio Patológico

Dispersión 7,6 ms

Latencia 11,7 ms

Estimulación del nervio mediano en la muñeca y registro en eminencia tenar: qué interpreta en el registro patológico?

- A. Latencia prolongada.
- B. Latencia reducida.
- C. Amplitud disminuída.
- D. a y c son correctas.

Contador
de
contestaci
ones

30

Si el resto del nervio conduce a una velocidad normal, y los otros nervios conducen normalmente, el diagnóstico más probable es:

- A. Tunnel carpiano.
- B. ELA.
- C. Guillain-Barré.

Contador de contestaciones

ESTUDIOS DE NEUROCONDUCCIÓN

Exploración de fibras gruesas y mielínicas de los nervios motores y sensitivos

Pregunta:

Introducir texto de pregunta

- A. Registro normal.
- B. Polineuropatía axonal.
- C. Polineuropatía desmielinizante.

Registro normal.

Polineuropatía axonal.

Polineuropatía desmielinizante.

Contador
de
contestaciones

30

NEUROPATÍAS AXONALES

- Velocidades de conducción normales o algo reducidas
- CMAPs y SNAPs de baja amplitud

Degeneración axonal

Pregunta:

Introducir texto de pregunta

- A. Polineuropatía desmielinizante
- B. Polineuropatía axonal.
- C. Ninguna es correcta.

Contador
de
contestaci
ones

30

NEUROPATÍAS DESMIELINIZANTES

- Enlentecimiento de las velocidades de conducción
- Prolongación de las latencias distales

BLOQUEO DE CONDUCCIÓN

- Disminución de la amplitud del PEV proximal respecto al distal (algunos impulsos no pueden atravesar la zona de lesión).
- En neuropatías con desmielinización focal (mayor frecuencia).

Amplitud del potencial de acción (CMAP)

Pregunta:

La estimulación repetida del nervio produce este registro

Introducir texto de pregunta

- A. Registro de miastenia.
- B. Registro de síndrome de Lambert-Eaton.
- C. Registro de botulismo.
- D. Registro normal.

Contador
de
contestaciones

30

Para tener en cuenta.....

Realizar... **SIEMPRE O EN LO POSIBLE**... EMG con VC motoras y sensitivas

No apresurarse a pedir un EMG... **ESPERAR UN TIEMPO**... (2 a 3 sem o +)

Algunas veces... **PEDIRLO ANTES**... (Enf Agudas como el SGB)

La clínica... **PUEDA PRECEDER**... a los hallazgos electromiográficos... (STC)

En estimulación repetitiva... **SUSPENDER** Piridostigmina

Para tener en cuenta.....

VC en pacientes con cardiodesfibriladores y marcapasos...**RIESGO**... de inhibición por estímulo cercano. (Consultar con el cardiólogo)

VC en pacientes con catéteres o vías centrales intracardíacas... **CONTRAINDICADO**

EMG... **NUNCA**... con menos de 20.000/mm plaquetas

EMG en Pacientes anticoagulados... **SOLO CON**... RIN mayor a 2.
(Consultar al hematólogo)

Preguntas